





呂子厚作 沈仲圭接

（答）單寧酸味苦澀。有收斂之性。能使微血管收縮。內服能治大小腸出血。及痢疾腹瀉等症。外用可止各種流血。（仲圭接吾友王心齋醫生常告余曰。生半夏研末。治刀傷出血甚佳。）惟內服稍多。可使消化不良。大便秘利。此又不可不知也。中醫治吐血。好用鮮藕節。治痢疾。好用萊菔。此與科學原理暗合矣。

●腫病辨症及其治

再講到治方。各埠的病。都有虛實寒熱之不同。醫生處方。應按病候。補瀉溫涼。原無一定。那有呆板的死方法。茲將通用簡便各方。介紹於后。

(水腫氣腫通用方) 活黑魚一尾。重七八兩。去鱗甲。割開。去腸淨。用好黑鹽五分。松蘿茶二錢。男用蒜八片。女用蒜七片。共入魚腹內。磁器中蒸熱。令病人連茶服食之。從魚頭吃起。病從頭上消。從尾吃起。病從足下消。(又方) 薑星稻草煎湯。傾入盆內。先坐盆

氣味 甘鹹微寒  
名稱 又名串麥  
功用 健胃化食

[illegible]

烟與酒 (蔡龍祥)

形畢現，或任酒罵座，或恣意侮人，其致於失手傷命的也有，不但有傷身體，而且還喪失人格，釀了禍端，酒的害處，也不亞於鴉片。

文人雅士，嗜酒的也不少，如李白的斗酒三百篇，歐陽修自號醉翁，劉伶自稱爲酒徒，流風靡往，千古傳爲佳話，不過醉而狂是雅士，醒而狂落第，凡夫俗子，豈敢放蕩即卑鄙了。

文人當醉之間，都以煙酒爲接待品，逢作戲的勾當，我們不能完全說不染，但也要有分寸，不過鴉片是傷身弱精的東西，不是鴉片不能嘗試的。

(未完)

之明魁	女極海	青年男	之慈航	切疾苦	青年一
容	容	容	容	容	容
△夾陰傷	△脫陽急	△陽萎自	△早洩求	△手淫防	△滑精特
△遺精避	△夢遺外	△遺精避	△夢遺外	△遺精避	△夢遺外

(王慎軒)

復發。(又方)相殺炒黃色。煎水服。(又方)田螺不拘多少。水漂。加香油一盞於水內。其涎自然吐出。取涎曬干爲末。每服三分。酒調下。其水自小便而下。其氣自大便而出。其腫即消。(又方)大蒜十枚。搗成泥。入蛤粉爲丸。梧子大。每食前白湯下二十九。小便多即愈。(又方)取癩蝦蟆六只。將四足扎住。以蝦蟆肚皮。在人肚皮光亮之處。輕輕摩擦數次。再取一癩蝦蟆。照前摩擦。用至六只即愈。但蝦蟆屑內

即噴嚏。俗稱打嚏。

(形態)鼻中作癢。發出劇烈之呼氣。從鼻孔迸出。

(原理)氣管受外界之刺激。或陽氣不得伸。

(作用)能噴出刺激物。或伸發陽氣。

呿 即呵欠。俗稱呵斯。

(形態)脣而伸腰。先張口吸長氣。繼則收緊口及顏面之筋肉。以呼氣移。

(原理)肺內衰氣。(即衰寒二)因久滯不得休息。遂多積蓄。或陰寒陰來引動。

(作用)能排出肺內所積蓄之衰氣。或使人欲睡。

呿 俗稱呿呼。

(形態)鼻息作呼呼之聲。

(原理)因軟口蓋及懸壺垂之呼氣而生顫動。唾中多有之。

(作用)能使空中之微細物。不易侵入肺管。

嚥 俗稱吃過。或呃逆。

(形態)喉胸間吸入劇短之氣。呃呃作聲。(未完)

楊志一編

(七)參附湯。(人參半兩、炮附子去皮破片一兩、分作三服。加生姜煎)治氣陽不足。上氣短急。自汗盜汗。氣短頭暈。以上二方治陽之法。蓋陰虛之極者。陽亦能治。又當以陽爲急也。陽虛欲脫。又當雷之火無制非此方莫能治也。

(八)保和湯。(二母、二冬、冬花各三錢、花粉、苘仁、杏仁炒各二錢、炙草、紫苑、羌活、兜鈴、百合、桔梗各一錢、阿膠、生地、當歸、紫蘇、薄荷各五分、生薑三片、水煎飴糖一匙日三服)此方治虛勞肺燥成癆。服之大補。

(九)理玉膏。(人參半斤兩淨爲末、白茯苓。(廿四兩爲末、地黃。生土六斤搗取汁)、蜜六斤、右汁入銀石器內。以油紙包口外。仍以箸縛縛緊。重湯內熬熟矣。文火不住。三晝夜入井中。浸一日去火毒。又煮一日出殘毒。取出空心酒或白湯調下。

(未完)

有蟬酥。須防其逃出。射入傷眼。宜用細帕遮住病人兩眼。蝦蟆用過之後。即放水中。使吐毒氣。以救其命。至要至要。

〔又方〕韭菜連根。多加鹽搗爛。敷臍上。

〔又方〕冬瓜白蠟。水浸汁。淡食之。

〔又方〕大田螺四個。大蒜五個。車前子三錢。爲末。共搗成餅。貼臍中。以布束縛。水從小便而出。其腫漸消。終身戒食田螺。

〔又方〕蕎麥粉。每日和稀粥吃數次。氣下行即愈。

(元)